Bild-Detail:

1. Auf entzündlich-toxischer Basis
(Chronische Eiterherde an Mandeln, Zähnen, Nebenhöhlen, Gallenblase, Blinddarm usw.
Anfälligkeit nach schweren Infektionskrankheiten
Reizmittelmißbrauch (Nikotin, Koffein, Pervitin usw.),
Berufliche Schädigungen (Kohlenoxyd, Blei usw.)
2. Bei anlagemäßiger oder erworbener Überempfindlichkeit
3. Bei Störungen der Drüsensfunktionen:
Zwischenhirnstörungen
Ausfall der Sexualhormone in den Wechseljahren
Kalkmangelerscheinungen bei Ausfall der Nebenschilddrüsen
Ausfall der Nebennierenhormone
Drüsenstörungen infolge einer Schwangerschaft
4. Entgleisung des vegetativen Nervensystems:
 - a) Mangelhaftes Kreislauftraining bei Beschränkung körperlicher Betätigung in der Jugend
 - b) Übertraining beim Sport
 - c) Plötzlicher Trainingsabbruch beim Hochleistungssportler
 - d) Exzesse und ungenügender SchlafÜbermüdung bei geistigen und seelischen Spannungen
5. Schreck bei traurigen, aber auch freudigen Ereignissen
6. Schädelverletzungen mit Entwicklung von Zwischenhirnstörungen