Bild-Detail:



1. Auf entzündlich-toxischer Basis
   Chronische Eiterherde an Mandeln, Zähnen, Nebenhöhlen, Gallenblase, Blinddarm usw.
   Anfälligkeit nach schweren Infektionskrankheiten
   Reizmittelmißbrauch (Nikotin, Koffein, Pervitin usw.)
   Berufliche Schädigungen (Kohlenoxyd, Blei usw.)
2. Bei anlagemäßiger oder erworbener Überempfindlichkeit
3. Bei Störungen der Drüsenfunktionen:
   Zwischenhirnstörungen
   Ausfall der Sexualhormone in den Wechseljahren
   Kalkmangelerscheinungen bei Ausfall der Nebenschilddrüsen
   Ausfall der Nebennierenhormone
   Drüsenstörungen infolge einer Schwangerschaft
4. Entgleisung des vegetativen Nervensystems:
   a) Mangelhaftes Kreislauftraining bei Beschränkung körperlicher Betätigung in der Jugend
   b) Übertraining beim Sport
   c) Plötzlicher Trainingsabbruch beim Hochleistungssportler
   d) Exzesse und ungenügender Schlaf
   Übermüdung bei geistigen und seelischen Spannungen
5. Schreck bei traurigen, aber auch freudigen Ereignissen
6. Schädelverletzungen mit Entwicklung von Zwischenhirnstörungen